ЛП-№(004634)-(РГ-RU) от 26.09.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.09.2025 № 23651
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Ангиовит®, 4 мг + 5 мг + 0,006 мг, таблетки, покрытые оболочкой

Действующие вещества: пиридоксин + фолиевая кислота + цианокобаламин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Ангиовит®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Ангиовит®.
3. Прием препарата Ангиовит®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Ангиовит®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Ангиовит®, и для чего его применяют

Препарат Ангиовит® содержит три действующих вещества: пиридоксин, фолиевую кислоту и цианокобаламин, которые относятся к витаминам группы В. Препарат Ангиовит® относится к фармакотерапевтической группе, называемой «витамины; другие комбинированные витаминные препараты; комбинации витаминов».

Фолиевая кислота участвует в синтезе аминокислот, стимулирует процесс образования эритроцитов (эритропоэз). Фолиевая кислота снижает риск самопроизвольного выкидыша на ранних сроках беременности, а также предупреждает возникновение врожденных аномалий плода, связанных с дефицитом поступления фолиевой кислоты во время внутриутробного развития.

Витамин B_{12} (цианокобаламин) участвует во многих процессах обмена веществ, необходим для синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Цианокобаламин

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.09.2025 № 23651
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

участвует в образовании компонентов оболочки нервных волокон. Повышает устойчивость красных кровяных телец (эритроцитов) к разрушению (гемолизу). Повышает способность тканей к восстановлению (регенерации).

Витамин B_6 (пиридоксин) участвует в обмене веществ, необходим для нормального функционирования нервной системы. Предупреждает развитие тошноты и рвоты при токсикозе беременных. Препарат Ангиовит® восполняет нехватку витамина B_6, которая может возникать в случае приема пероральных контрацептивов до беременности.

Показания к применению

Препарат Ангиовит® показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет:

- для профилактики дефицита витаминов, входящих в состав препарата;
- при повышенном содержании в плазме крови аминокислоты гомоцистеина (гипергомоцистеинемии).

Способ действия препарата

Витамины группы В (фолиевая кислота, B_6 и B_{12}) играют важную роль в метаболизме гомоцистеина. Препарат Ангиовит® обладает способностью активировать в организме ключевые ферменты, ускоряющие снижение в крови концентрации гомоцистеина. Высокий уровень гомоцистеина – фактор ряда заболеваний: сердечно-сосудистые заболевания (в том числе тромбоз, инфаркт, инсульт, ишемическая болезнь сердца), осложнения при беременности, нервно-психические расстройства. На фоне комплексного применения указанных витаминов происходит нормализация уровня гомоцистеина в крови.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Ангиовит®

Противопоказания

Не принимайте препарат Ангиовит®, если:

- у Вас аллергия на пиридоксин, фолиевую кислоту, цианокобаламин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, дефицит сахаразы-изомальтазы;
- Вы кормите грудью;
- Вам или Вашему ребенку меньше 18 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.09.2025 № 23651
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Ангиовит® проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Дети и подростки

Препарат Ангиовит® противопоказан к применению у детей и подростков до 18 лет.

Другие препараты и препарат Ангиовит®

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Врачу необходимо знать о препаратах, которые Вы принимаете, чтобы учесть возможные нежелательные реакции, которые могут развиться из-за взаимодействия различных препаратов с препаратом Ангиовит®, а также, возможно, скорректировать дозы принимаемых Вами препаратов.

В частности, сообщите врачу, если Вы принимаете какие-либо из перечисленных ниже препаратов:

- противосудорожные препараты. Фолиевая кислота снижает эффект фенитоина (требуется увеличение его дозы). Противосудорожные препараты (в том числе фенитоин и карбамазепин) увеличивают потребность в фолиевой кислоте;
- обезболивающие препараты (при длительной терапии) увеличивают потребность в фолиевой кислоте;
- пероральные контрацептивы (эстрогены) увеличивают потребность в фолиевой кислоте, ослабляют эффект пиридоксина;
- антациды, в т. ч. препараты алюминия и магния (применяются для лечения язвы желудка, изжоги) снижают всасывание фолиевой кислоты;
- колестирамин (средство для снижения холестерина в крови) снижает всасывание фолиевой кислоты;
- противомикробные средства (сульфонамины, в т. ч. сульфасалазин) снижают всасывание фолиевой кислоты;
- метотрексат (применяется для лечения рака или аутоиммунных заболеваний) снижает эффект фолиевой кислоты;
- пириметамин (противомалярийное средство) снижает эффект фолиевой кислоты;
- триамтерен (мочегонное средство) снижает эффект фолиевой кислоты;
- триметоприм (антибактериальное средство) снижает эффект фолиевой кислоты;
- диуретики (мочегонные препараты), пиридоксина гидрохлорид усиливает действие диуретиков;
- леводопа (средство для лечения болезни Паркинсона), пиридоксина гидрохлорид

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.09.2025 № 23651
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

ослабляет активность леводопы;

- изоникотина гидразид (противотуберкулезный препарат), ослабляет эффект пиридоксина;
- пеницилламин (применяется при отравлениях металлами), ослабляет эффект пиридоксина;
- циклосерин (антибиотик), ослабляет эффект пиридоксина;
- сердечные гликозиды (применяются для лечения сердца), пиридоксин способствует повышению синтеза сократительных белков в сердечной мышце;
- глутаминовая кислота (применяется для лечения болезней нервной системы), повышается устойчивость к недостатку кислорода;
- аспаркам (восполнение дефицита калия и магния), повышается устойчивость к недостатку кислорода;
- аминогликозиды (антибиотики), снижают всасывание цианокобаламина;
- салицилаты (аспирин и т. п.), снижают всасывание цианокобаламина;
- противоэпилептические препараты, снижают всасывание цианокобаламина;
- колхицин (для лечения подагры), снижает всасывание цианокобаламина;
- препараты калия, снижают всасывание цианокобаламина;
- тиамин (витамин B_1), усиливается риск развития аллергических реакций;
- нельзя сочетать с препаратами, повышающими свертываемость крови (викасол, этамзилат).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Препарат Ангиовит® можно принимать в период беременности только при рекомендации врача.

Грудное вскармливание

Фолиевая кислота проникает в грудное молоко. Применение препарата Ангиовит противопоказано в период грудного вскармливания (см. раздел «Противопоказания»).

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Нет данных о влиянии приема препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Ангиовит® содержит сахарозу

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.09.2025 № 23651
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата Ангиовит®

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Взрослые

По 1 таблетке в день.

Применение у детей и подростков

Не давайте таблетки Ангиовит® детям от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата у детей и подростков не установлены. Данные отсутствуют.

Путь и (или) способ введения

Внутрь, вне зависимости от приема пищи.

Продолжительность лечения

Курс лечения – 20–30 дней. При необходимости курс лечения можно повторить по назначению врача.

Если Вы приняли препарата Ангиовит® больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Ангиовит® больше, чем следовало, всегда следует обратиться к врачу или в ближайшую больницу для оценки риска и получения рекомендаций по дальнейшим действиям.

Симптомы передозировки: кожные высыпания, зуд, покраснения кожи (эритема), тошнота, головокружение.

Лечение: первая помощь заключается в промывании желудка, приеме активированного угля, симптоматической терапии.

Если Вы забыли принять препарат Ангиовит®

Если Вы забыли принять препарат, не беспокойтесь. Примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата Ангиовит®

Ваш лечащий врач порекомендует Вам, как долго следует продолжать прием препарата Ангиовит®.

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. Не прекращайте прием препарата Ангиовит® без предварительной консультации с лечащим врачом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.09.2025 № 23651
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Ангиовит® может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Ангиовит® и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков нежелательных реакций:

Частота неизвестна (частоту возникновения нежелательных реакций нельзя определить на основании имеющихся данных):

• нарушение дыхания, связанное с сужением просвета бронхов (бронхоспазм).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Ангиовит®

Частота неизвестна (частоту возникновения нежелательных реакций нельзя определить на основании имеющихся данных):

• аллергические реакции (кожная сыпь, кожный зуд);

• покраснение кожи (эритема);

• повышение температуры (гипертермия).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр.1

Тел.: +7 800 550-99-03

Эл. почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

https ://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Тел.: +374 60 83-00-73

Эл. почта: info@ampra.am

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.09.2025 № 23651
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

5. Хранение препарата Ангиовит®

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной упаковке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 ºС.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) лекарственный препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Ангиовит® содержит

Действующими веществами являются: пиридоксин, фолиевая кислота и цианокобаламин.

Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит 4 мг пиридоксина (в виде гидрохлорида), 5 мг фолиевой кислоты и 0,006 мг цианокобаламина.

Прочими вспомогательными веществами являются: *ядро таблетки*: сахароза, крахмал картофельный, кроскармеллоза натрия (примеллоза), тальк, кальция стеарат; *оболочка таблетки*: сахароза, мука пшеничная, магния карбонат основной, титана диоксид, метилцеллюлоза, желатин, вазелиновое масло (парафин жидкий), воск пчелиный, тальк.

Препарат Ангиовит® содержит сахарозу (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Ангиовит® и содержимое его упаковки

Таблетки, покрытые оболочкой.

Препарат Ангиовит® представляет собой круглые, двояковыпуклые таблетки белого цвета, покрытые оболочкой. На поперечном разрезе видны два слоя.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной марки ЭП-73 и фольги алюминиевой.

5 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.09.2025 № 23651
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Эл. почта: office@altayvitamin.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Республика Армения

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза: https://eec.eaeunion.org/