

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**ОЛАЗОЛЬ®****Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Олазол®**Международное непатентованное или группировочное наименование:**Бензокаин + Борная кислота + Облепихи крушиновидной плодов масло +
Хлорамфеникол**Лекарственная форма:** аэрозоль для наружного применения**Состав:**

Состав на 1г:

Действующие вещества:

Облепихи крушиновидной плодов масло	90,0 мг
Хлорамфеникол	27,0 мг
Бензокаин (анестезин)	27,0 мг
Борная кислота	4,5 мг

Вспомогательные вещества:

Троламин	37,8 мг
Ланолин безводный	4,5 мг
Стеариновая кислота	50,4 мг
Глицерол	90,0 мг
Вода очищенная	568,8 мг
Тetraфторэтан (HFA-134a)	100,0 мг

Описание: препарат при выходе из баллона образует пену желтого или желтого со слегка оранжевым оттенком цвета.**Фармакотерапевтическая группа:** другие препараты, применяемые в дерматологии.**Код АТХ:** D11AX**Фармакологические свойства:**

Ранозаживляющее средство. Оказывает анестезирующее и антибактериальное действие, уменьшает экссудацию, способствует регенерации тканей и ускоряет процесс эпителизации ран.

Показания к применению:

Инфицированные раны (в т.ч. вялозаживающие раны), трофические язвы, ожоги, свободная кожная пластика, микробная экзема, зудящий дерматит.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность, период грудного вскармливания, период новорожденности.

С осторожностью:

Ранний детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы:

Наружно. Раневую поверхность по возможности очищают от гноя, некротических тканей и покрывают равномерным слоем пены ежедневно или через день, а при открытом лечении ран и ожогов - 1-4 раза в сутки, в зависимости от характера воспаления и стадии регенерации поврежденных тканей. Курс лечения определяется индивидуально лечащим врачом.

Для получения равномерного слоя пены баллон необходимо встряхнуть (10-15 раз). Пену наносят до покрытия всей раневой поверхности, с расстояния 1-5 см.

Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Нарушения со стороны иммунной системы

Аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Сведения о передозировке препаратом отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

В период лечения возможно использование системной антибактериальной терапии.

Возможность и необходимость применения с другими наружными лекарственными средствами определяется индивидуально лечащим врачом в зависимости от характера воспаления и стадии регенерации поврежденных тканей.

При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином возможно взаимное ослабление действия за счет того, что хлорамфеникол может вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с 50S субъединицей бактериальных рибосом. Хлорамфеникол снижает антибактериальный эффект пенициллинов, цефалоспоринов.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Олазол[®] проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания:

Не допускать попадания в глаза.

Препарат Олазол содержит ланолин, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не влияет на способность управлять автотранспортом или работу с другими потенциально-опасными механизмами.

Форма выпуска:

Аэрозоль для наружного применения, 27 мг/г + 4,5 мг/г + 90 мг/г + 27 мг/г.
По 80 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные клапаном непрерывного действия из алюминия и полиэтилена, распылительной насадкой из полиэтилена и предохранительным колпачком из полипропилена.

На баллон аэрозольный алюминиевый наносят литографию или наклеивают этикетку из самоклеящейся бумаги.

Каждый баллон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения:

При температуре не выше 15 °С, вдали от источников огня, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс: +7 (3854) 326-943

Эл. почта: office@altaivitamin.ru

Организация, принимающая претензии потребителей:

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.09.2024 № 19456
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Тел.: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru