

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### МЕТИЛУРАЦИЛ

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Метилурацил.

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Диоксометилтетрагидропиримидин.

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные.

**Состав на один суппозиторий**

Действующее вещество:

диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 500 мг.

Вспомогательное вещество:

твердый жир – достаточное количество для получения суппозитория массой 2,3 г.

#### **Описание**

Суппозитории белого цвета или белого с желтоватым или кремоватым оттенком, торпедообразной формы.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ.

**Код АТХ:** A16AX.

#### **Фармакологические свойства**

Обладает анаболической активностью. Оказывает гемопоэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию (в том числе в быстропролиферирующих клетках слизистой оболочки ЖКТ), стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета.

## Фармакокинетика

Препарат быстро абсорбируется в слизистой оболочке прямой кишки и обнаруживается в системном кровотоке через 30 минут. Максимальное содержание действующего вещества в плазме крови наблюдается спустя 60—120 минут после введения суппозитория. Выводится из организма через почки и кишечник.

## **Показания к применению**

Проктит, сигмоидит, язвенный колит.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к диоксометилтетрагидропиримидину или к вспомогательному веществу, лейкоз (лейкемические формы), лимфогранулематоз, гемобластозы, злокачественные заболевания костного мозга, детский возраст до 8 лет.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Специальных исследований, касающихся безопасности применения препарата Метилурацил суппозитории ректальные у беременных и в период грудного вскармливания, не проводилось. Препарат применяют при беременности и в период грудного вскармливания только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## **Способ применения и дозы**

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника.

Взрослым — по 1—2 суппозитория 3—4 раза в сутки, детям в возрасте 8—18 лет - по 1 суппозиторию в сутки.

Перед применением препарата следует тщательно вымыть руки. Суппозиторий вынимают из контурной ячейковой упаковки и вводят в прямую кишку. Для достижения максимального терапевтического эффекта суппозиторий следует вводить как можно глубже.

Длительность курса лечения от 7 дней до 4 месяцев, в зависимости от характера заболевания. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Повторные курсы лечения проводят по рекомендации врача.

### **Побочное действие**

*Нарушения со стороны иммунной системы:* аллергические реакции.

*Нарушения со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* кратковременное ощущение жжения в области прямой кишки.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не изучалось.

### **Особые указания**

Нет сведений.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, учитывая возможность развития побочного действия— головокружения.

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 500 мг.

По 5 суппозиториям в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

Эл. почта: office@altayvitamin.ru

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:**

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru