

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Линимент бальзамический (по Вишневскому)****Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Линимент бальзамический (по Вишневскому)**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Деготь березовый + Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс

Лекарственная форма: линимент для наружного применения**Состав на 100 г линимента***Действующие вещества:*

деготь березовый	3 г
трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс [ксероформ]	3 г

Вспомогательные вещества:

кремния диоксид коллоидный [аэросил]	5 г
касторовое масло	89 г

Описание

Линимент от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства .

Код АТХ: D08AX**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению кровоснабжения тканей.

Трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.

Показания к применению

Неинфицированные, длительно незаживающие послеоперационные, посттравматические раны кожи и мягких тканей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к дегтю березовому, трибромфенолята висмута и висмута оксида комплексу (ксероформу) или любым вспомогательным веществам препарата; острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в том числе абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают марлевую повязку, пропитанную линиментом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы:

аллергические реакции.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:

при длительном применении возможно раздражение кожи.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: зуд, сыпь.

Лечение: отмена препарата и симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания линимента в глаза или приема внутрь. В случае попадания в глаза их необходимо промыть водой и обратиться к врачу.

Руки после нанесения линимента необходимо тщательно вымыть для предотвращения попадания препарата в глаза, нос и рот. Не рекомендуется применять лицам с повышенной чувствительностью к фенолу и его производным.

Линимент имеет специфический запах и оставляет следы на одежде.

Препарат содержит касторовое масло, которое при местном применении может вызывать кожные реакции.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Линимент для наружного применения.

По 30 г в тубы алюминиевые с мембраной, бушонами из полиэтилена низкого давления. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

Эл. почта: office@altayvitamin.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Телефон: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru