

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**ПЕНТОВИТ**

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пентовит

Группировочное наименование: поливитамины

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой.

Состав на одну таблетку

Действующие вещества:

тиамина гидрохлорид (витамин В ₁)	- 10 мг
пиридоксина гидрохлорид (витамин В ₆)	- 5 мг
никотинамид	- 20 мг
фолиевая кислота	- 0,4 мг
цианокобаламин (витамин В ₁₂)	- 0,05 мг

Вспомогательные вещества для получения
таблетки-ядра массой 0,20 г:

сахароза	- 111,000 мг
кроскармеллоза натрия (примеллоза)	- 8,000 мг
тальк	- 3,000 мг
кальция стеарат	- 2,000 мг
крахмал картофельный	- 40,550 мг

Вспомогательные вещества для получения
оболочки массой 0,14 г:

сахароза	- 67,50 мг
воск пчелиный	- 0,17 мг

тальк	- 0,10 мг
магния карбонат основной	- 25,67 мг
мука пшеничная	- 37,44 мг
метилцеллюлоза	- 0,67 мг
желатин	- 0,36 мг
парафин жидкий (вазелиновое масло)	- 0,17 мг
титана диоксид [E171]	- 7,92 мг
Масса таблетки	- 0,34 г

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Витамины; другие комбинированные витаминные препараты; комбинации витаминов.

Код АТХ: A11JA

Фармакологические свойства

Поливитаминовый препарат, действие которого обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для комбинации данных витаминов является их сочетанное действие на функциональное состояние центральной и периферической нервной системы.

Показания к применению

Комплексная терапия заболеваний периферической (радикулит, невралгии, невриты) и центральной нервной системы, астенические состояния разного генеза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (эффективность и безопасность применения не исследованы).

Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата Пентовит при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 2-4 таблетки 3 раза в день (после еды). Курс лечения - 3-4 недели. Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы

Аллергические реакции к компонентам препарата (зуд, крапивница).

Нарушения со стороны сердца

Тахикардия.

Желудочно-кишечные нарушения

Тошнота.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Витамин В₆, входящий в данный комплекс, снижает противопаркинсоническую активность леводопы. Алкоголь резко снижает всасывание витамина В₁.

Особые указания

Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не рекомендуется одновременный прием поливитаминных комплексов, включающих в состав витамины группы В.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

По 10, 50 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

1, 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению или 1, 2 контурные ячейковые упаковки по 50 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 40-270 контурных ячейковых упаковок по 50 таблеток вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку (для стационаров).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Телефон: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

Эл. почта: office@altayvitamin.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Телефон: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.10.2024 № 22855
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru