

Листок-вкладыш – информация для пациента**Ацикловир, 50 мг/г, мазь для наружного применения**

Действующее вещество: ацикловир.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 10 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Ацикловир и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Ацикловир.
3. Применение препарата Ацикловир.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Ацикловир.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Ацикловир и для чего его применяют

Препарат Ацикловир содержит действующее вещество ацикловир и относится к группе противовирусных препаратов.

Показания к применению

Ацикловир показан к применению у взрослых, детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет для лечения вирусных инфекций, вызванных вирусом *Herpes simplex*, губ и кожи лица (повторяющийся (рецидивирующий) герпес губ).

Способ действия препарата Ацикловир

Ацикловир высокоактивен в отношении вируса *Herpes simplex* (HSV) 1-го и 2-го типов. После попадания в клетки, зараженные вирусом герпеса, ацикловир превращается в активное соединение ацикловира трифосфат, которое препятствует дальнейшему созданию вирусной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), тем самым препятствуя размножению вируса.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 10 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Ацикловир

Противопоказания

Не применяйте препарат Ацикловир, если:

у Вас аллергия на ацикловир, валацикловир или любые другие компоненты препарата Ацикловир (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Ацикловир проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно сообщите врачу, если:

- Вы беременны;
- Вы кормите грудью.

Применяйте препарат исключительно при герпесе кожи губ и лица. Не наносите на слизистые оболочки полости рта, глаз и влагалища. Не применяйте с целью лечения генитального герпеса. Избегайте попадания мази в глаза.

При выраженных проявлениях рецидивирующего герпеса проконсультируйтесь с врачом. Пациентам с герпесом губ следует избегать передачи вируса, особенно при наличии активных поражений.

Пациентам с иммунодефицитными состояниями не рекомендуется применять препарат. Такие пациенты при лечении любых инфекционных заболеваний должны следовать рекомендациям врача.

Несмотря на то, что в основном ацикловир выводится почками, систематическая абсорбция ацикловира после наружного применения незначительна. Соответственно, нет необходимости для изменения дозы пациентам с почечными или печеночными нарушениями.

Некоторые пациенты, принимающие препарат Ацикловир, сообщали о развитии симптомов, характерных для аллергической реакции (гиперчувствительности), в том числе о случаях

ангионевротического отека. Эти симптомы включают отек лица, губ, языка и горла, а также диффузную кожную сыпь. При возникновении любой из вышеперечисленных реакций следует немедленно обратиться к врачу.

Другие препараты и препарат Ацикловир

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

При наружном применении взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза превышает потенциальный и неизвестный риск, однако всасывание ацикловира при местном применении мази очень низкое.

Ограниченные данные показывают, что при регулярном применении ацикловир попадает в грудное молоко. Однако доза, которую получит младенец, находящийся на грудном вскармливании, будет незначительна.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат Ацикловир содержит метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) и пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), цетостеариловый спирт.

Препарат Ацикловир содержит метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) и пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), которые могут вызывать аллергические реакции (в том числе отсроченные).

Препарат Ацикловир содержит цетостеариловый спирт. Может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Ацикловир

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Препарат рекомендуется наносить 5 раз в день, примерно каждые 4 часа, за исключением ночного времени, на пораженные и граничащие с ними участки кожи.

Применение у детей и подростков

Режим дозирования для детей не отличается от режима дозирования для взрослых.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в листке-вкладыше.

Важно как можно раньше начинать лечение, желательно, при появлении первых признаков и симптомов. Лечение также может начаться на более поздних стадиях (папула или пузырь).

Чтобы не допустить ухудшения состояния и предупредить распространение инфекции, необходимо мыть руки до и после нанесения препарата, не тереть и не прикасаться к пораженным участкам кожи полотенцем.

Продолжительность лечения

Длительность лечения – не менее 4 дней. В случае отсутствия заживления лечение может быть продолжено до 10 дней. В случае сохранения симптомов заболевания более 10 дней следует обратиться к врачу.

Если Вы применили препарата Ацикловир больше, чем следовало

При случайном приеме внутрь возможны следующие симптомы: головная боль, неврологические нарушения, одышка, тошнота, рвота, диарея, нарушения функции почек. Лечение: поддержание жизненно важных функций, гемодиализ..

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы забыли применить препарат Ацикловир

Вы должны использовать препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, или как указано в листке-вкладыше, так как регулярность применения делает лечение более эффективным.

Тем не менее, если Вы забыли применить лекарственный препарат, используйте следующую дозу в обычное время. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Ацикловир может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Ацикловир и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции:

- отек лица, языка или глотки, проблемы с глотанием, затрудненное дыхание (признаки тяжелой аллергической реакции, известной как ангионевротический отек).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при местном применении препарата Ацикловир:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- кратковременные жжение, покалывание на участках нанесения препарата, небольшая сухость или шелушение, зуд.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- покраснение (эритема);
- воспаление кожи, вызванное контактом с раздражающим веществом после нанесения (контактный дерматит в месте нанесения).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- заболевание, проявляющееся появлением зудящих, красных волдырей на поверхности кожи (крапивница (уртикарные высыпания)).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Тел.: +7 800 550-99-03

Эл. почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

или npr@roszdravnadzor.gov.ru

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, пер. Товарищеский, д. 2а

Тел.: +375 17 242-00-29

Эл. почта: rcpl@rceth.by

<https://www.rceth.by>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, д. 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

Тел.: +7 7172 235-135

Эл. почта: pdlc@dari.kz

<https://www.ndda.kz>

5. Хранение препарата Ацикловир

Храните препарат в недоступном для детей месте..

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной упаковке и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Ацикловир содержит

Действующим веществом является ацикловир.

Каждый грамм мази содержит 50 мг ацикловира.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: липокомп «С», Макрогол 400, цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А), метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная.

Препарат Ацикловир содержит метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, цетостеариловый спирт (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Ацикловир и содержимое его упаковки

Мазь для наружного применения.

Однородная мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

По 10 г в тубы алюминиевые с мембраной, бушонами из полиэтилена низкого давления.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

Электронная почта: office@altayvitamin.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан

АО «Алтайвитамины»

659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru

Различные торговые наименования

Российская Федерация: Ацикловир

Республика Беларусь: Ацикловир-АВ

Республика Казахстан: Ацикловир

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) <http://www.grls.rosminzdrav.ru> (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).