

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
КАМЕТОН

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Каметон

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Камфора + Лвоментол + Хлоробутанол + Эвкалипта листьев масло эфирное

Лекарственная форма: спрей для местного применения.

Состав на 1 г

Действующие вещества:

камфора рацемическая	10 мг
левоментол	10 мг
хлоробутанола гемигидрат	10 мг
эвкалипта листьев масло эфирное	10 мг

Вспомогательные вещества:

этанол (спирт этиловый 95 %)	40 мг
изопропилмиристат	920 мг

Описание

Содержимое баллона – маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом, образующая при выходе из баллона конус частиц жидкости, диспергированных в воздухе.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.

Код АТХ: R02AA20.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает местное антисептическое, противовоспалительное и легкое местноанестезирующее действие, способствует сужению сосудов, а также уменьшению кровенаполнения и отека пораженного участка, уменьшает симптомы раздражения слизистой оболочки глотки и гортани, способствует нормализации дыхания больных. Препарат оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных (кишечная палочка, синегнойная палочка) бактерий и в меньшей степени в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетических исследованиях препарата отсутствуют.

Показания к применению

Воспалительные заболевания лор-органов (в т. ч. ринит, фарингит, ларингит) в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 5 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Достаточный опыт по применению препарата при беременности и в период грудного вскармливания отсутствует. В связи с низкой системной абсорбцией компонентов, входящих в состав препарата, его местное применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Местно.

Распыляют в ротовую полость (вправо и влево) и носовые ходы (предварительно очистив их от слизи, слегка наклонив голову вперед, в каждую ноздрю, на фазе «вдоха»).

За одно применение у взрослых и детей старше 15 лет осуществляют по 1–3 распыления.

Дети в возрасте от 12 до 15 лет – по 1–2 распыления.

Дети от 5 до 12 лет – по 1 распылению.

Частота применения – 3–4 раза в сутки. Курс лечения – 7–10 дней.

При первом использовании препарата или перерыве в его использовании более 1 суток следует произвести несколько нажатий до появления дисперсной струи, после чего препарат можно применять.

При применении препарата баллон держать вертикально, распылителем кверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии.

Если после курса лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции в виде сыпи, зуда и покраснения кожи.

В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

Передозировка

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу.

Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов – активированного угля), симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия препарата с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания

При распылении в носовой полости не запрокидывать голову и не переворачивать баллон вверх дном. Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном нескольким пациентам во избежание распространения инфекции. Во время распыления препарата следует избегать его попадания в глаза.

Препарат содержит этанол (спирт этиловый). Данный лекарственный препарат содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее чем 100 мг на 1–3 распыления.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Спрей для местного применения, 10 мг/г + 10 мг/г + 10 мг/г + 10 мг/г.

По 15 г или 30 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные механическим насосом, распылительной насадкой и предохранительным колпачком.

На баллон наносят литографию или наклеивают этикетку из самоклеящихся материалов.

Каждый баллон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

При температуре от 0 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

Эл. почта: office@altayvitamin.ru

Организация, принимающая претензии от потребителей

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru