

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Алвипсал®

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.*

*Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.*

*Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

*Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование:** Алвипсал®

**Группировочное наименование**

Камфора + Салициловая кислота + Скипидар живичный + Яд гадюки

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения

**Состав на 100 г мази**

*Действующие вещества:* яд гадюки обыкновенной сухой – 5 мышинных единиц действия, салициловая кислота – 1,0 г, камфора – 3,0 г, скипидар живичный – 3,0 г.

*Вспомогательные вещества:* натрия хлорид – 0,072 г, эмульгатор № 1 – 8,0 г, парафины твердые – 3,0 г, вазелин – 7,0 г, глицерол (глицерин) – 2,0 г, вода очищенная – до 100 г.

**Описание:**

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета с запахом камфоры и скипидара.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Местнораздражающее средство природного происхождения.

**Код АТХ:** MO2AX10

## **Фармакологические свойства**

Болеутоляющая мазь с ядом гадюки.

Вызывает раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей. Оказывает местное раздражающее и анальгезирующее действие.

## **Показания к применению**

Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сопровождающиеся болевым синдромом (в т.ч. артралгии, невралгии, миалгии, ишиас, радикулит).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность, кожные заболевания (в том числе аллергического и бактериального генеза), активный туберкулез легких, лихорадочные состояния, общее истощение, тяжелая недостаточность мозгового и коронарного кровообращения, непереносимость салицилатов, склонность к ангиоспазмам, тяжелая печеночная и почечная недостаточность.

Детский возраст до 12 лет.

Беременность и период кормления грудью.

## **С осторожностью**

Детский возраст от 12 до 18 лет (необходимость применения препарата у детей определяется врачом индивидуально). Указания в анамнезе на бронхиальную астму, спровоцированную приемом ацетилсалициловой кислоты или иными нестероидными противовоспалительными препаратами.

## **Способ применения и дозы**

Применяется наружно у взрослых и детей старше 12 лет.

В зависимости от величины области болезненного участка наносят маленькими порциями 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази и втирают в кожу в зависимости от интенсивности боли 1-2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома.

Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания.

При сохранении симптомов болезни после 14-дневного лечения проконсультируйтесь с врачом.

**Побочное действие**

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек, или крапивница.

Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

*При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.*

**Передозировка**

О случаях передозировки не сообщалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не изучалось.

**Особые указания**

При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу.

При случайном попадании на слизистую оболочку мазь вызывает сильное раздражение.

После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

При попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой.

Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

**Форма выпуска**

Мазь для наружного применения.

По 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец РУ/ Предприятие-производитель/ Организация, принимающая претензии потребителей**

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Тел.: (3854) 338-719, 326-948, факс (3854) 326-943

Генеральный директор  
АО «Алтайвитамины»

А.Ф. Балушкин