

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (по Вишневскому)

Регистрационный номер:

Торговое наименование:

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Деготь+Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс

Лекарственная форма: линимент для наружного применения

Состав

100 г линимента содержат:

Действующие вещества: деготь березовый – 3 г, трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс [ксероформ] – 3 г;

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный [аэросил] – 5 г, касторовое масло – 89 г.

Описание

Линимент от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению кровоснабжения тканей.

Трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.

Показания к применению

Неинфицированные, длительно незаживающие послеоперационные, посттравматические раны кожи и мягких тканей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к дегтю березовому, трибромфенолята висмута и висмута оксида комплексу (ксероформу) или любым вспомогательным веществам препарата; острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в том числе абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают марлевую повязку, пропитанную линиментом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном применении возможно раздражение кожи.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: зуд, сыпь.

Лечение: отмена препарата и симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания линимента в глаза или приема внутрь. В случаях попадания в глаза, их необходимо промыть водой и обратиться к врачу.

Руки после нанесения линимента необходимо тщательно вымыть для предотвращения попадания препарата в глаза, нос и рот. Не рекомендуется применять лицам с повышенной чувствительностью к фенолу и его производным.

Линимент имеет специфический запах и оставляет следы на одежде.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности,

требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Линимент для наружного применения.

По 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/ Производитель/

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: (3854) 338-719, 326-948

Факс (3854) 326-943

Генеральный директор
АО «Алтайвитамины»

А.Ф. Балушкин