

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Облепиховое масло

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать использование этого лекарства.*

*Это лекарство отпускают без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.*

*Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*

*Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Облепиховое масло

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Облепихи крушиновидной плодов масло

**Лекарственная форма:** Масло для приема внутрь, местного и наружного применения

**Состав на 100 мг:**

Активный компонент:

Облепихового масла концентрат — 60 мг

(с содержанием суммы каротиноидов,  
в пересчете на  $\beta$ -каротин, 300 мг%)

Вспомогательное вещество:

Подсолнечника масло — до 100 мг

**Описание:** Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета с характерным запахом. Допускается незначительный осадок, растворяющийся при нагревании до 40 °С.

**Фармакотерапевтическая группа:** Стимулятор репарации тканей растительного происхождения.

**Код АТХ: D11AX**

**Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика:** Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек различной этиологии (лучевых, ожоговых, язвенных). Фармакологическое действие обусловлено наличием в облепиховом масле каротина (провитамина А), токоферолов (витамина Е) и других липофильных веществ.

**Показания к применению:** В комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек: в гастроэнтерологии – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; в гинекологии – кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки; в оториноларингологии – послеоперационные раны с целью ускорения заживления; в проктологии – наружный геморрой, трещины прямой кишки; в хирургии – для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах.

**Противопоказания:** Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату; при наружном и местном применении – профузное кровотечение, обильное гнойное отделяемое из раны; при применении внутрь – холецистит, холангит, панкреатит, холелитиаз, гепатит; при ректальном введении – диарея; детский возраст до 12 лет.

**С осторожностью:** При приеме внутрь – беременность, детский возраст старше 12 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы:** Наружно, местно, внутрь.

Наружно: при поражениях кожи в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций.

**Местно:** при кольпитах, эндоцервицитах, эрозии шейки матки, геморрое, трещинах прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпитах 10-15 процедур; эндоцервицитах, эрозии шейки матки 8-12 процедур; при наружном геморрое, трещинах прямой кишки 5-7 процедур. В оториноларингологии – при тимпанопластике, после обработки раны антибиотиками, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения – 7-10 процедур.

**Внутрь:** при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день в течение 3-4 недель.

**Побочное действие:** Аллергические реакции; жжение (при наружном и местном применении), при приеме внутрь: горечь во рту, диарея, желчная колика.

*Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

**Передозировка:** Нет данных о случаях передозировки препарата.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Нет данных о взаимодействии с другими препаратами.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

**Форма выпуска**

Масло для приема внутрь, местного и наружного применения.

По 30, 50, 100 мл во флаконы или бутылки темного стекла, укупоренные колпачками-крышками или полимерными крышками укупорочно-

навинчиваемыми с контролем первого вскрытия. Каждый флакон или бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается полный текст инструкции выносить на пачку без вложения инструкции.

**Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

1 год 6 мес.

Не применять после истечения срока годности.

**Условия отпуска:**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/ Производитель/**

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69.

Телефон: (3854) 338-719, 326-948;

факс (3854) 326-943.

Генеральный директор  
АО «Алтайвитамины»

Балушкин А.Ф.