

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ОЛЕСТЕЗИН®**

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.*

*Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.*

*Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

*Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Олестезин®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Бензокаин+Облепихи крушиновидной плодов масло+Сульфазтидол

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные.

**Состав на один суппозиторий:**

Действующие вещества:

облепихового масла концентрат – 330 мг

(с содержанием суммы каротиноидов  
в пересчете на β-каротин 300 мг/%)

сульфазтидол (этазол-натрий) – 50 мг

бензокаин (анестезин) – 100 мг

Вспомогательные вещества: полисорбат 80 (твин 80) – 40 мг, макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) – 60 мг, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) – 980 мг, макрогол 4000 (полиэтиленоксид 4000) – достаточное количество для получения суппозитория массой 2,35 г.

**Описание:** суппозитории от темно-оранжевого до красновато-коричневого цвета, торпедообразной формы.

**Фармакотерапевтическая группа:** геморроя средство лечения.

**Код АТХ:** С05АХ.

### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат обладает местноанестезирующим, противовоспалительным и антисептическим действием; способствует регенерации тканей при трещинах и эрозиях заднего прохода; оказывает кровоостанавливающее действие; снимает боль и уменьшает дискомфорт; ликвидирует воспаление и восстанавливает упругость капилляров, что обеспечивает уменьшение внутренних и наружных геморроидальных узлов.

### **Показания к применению**

Геморрой, анальные трещины, анальный зуд.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Ректально после гигиенических процедур по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.

При необходимости по 2-3 суппозитория 2 раза в сутки.

Курс лечения – 5-7 дней (не более 10 дней).

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

## **Побочное действие**

*Общие расстройства и нарушения в месте введения*

Местное раздражение, отек, сыпь в месте введения.

*Нарушения со стороны иммунной системы*

Аллергические реакции.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта*

Диарея.

*Нарушения со стороны крови и лимфатической системы*

Метгемоглобинемия.

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей*

Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **Передозировка**

*Симптомы*

В случае значительного превышения рекомендованных разовых и суточных доз препарата может произойти передозировка бензокаина. Симптомы передозировки могут проявляться сонливостью, беспокойством, возбуждением, в тяжелых случаях – судорогами. Крайне редко большие дозы бензокаина могут вызвать метгемоглобинемию, которая проявляется дыхательными расстройствами и цианозом.

*Лечение*

Внутривенное введение метиленового синего является специфическим средством в лечении этого состояния.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описано.

## **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами) отсутствуют.

## **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные.

По 5 суппозиторияев в контурную ячейковую упаковку. Две контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

## **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

## **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

## **Владелец регистрационного удостоверения/ производитель/ организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «Алтайвитамины»  
659325, Россия, Алтайский край,  
г. Бийск, ул. Заводская, д. 69.  
тел.: (3854) 338-719, 326-948;  
факс (3854) 326-943.

Генеральный директор  
АО «Алтайвитамины»

А.Ф.Балушкин